

شماره: ۳۰۴/۷۷۰۰

تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۲۹

پیوست: ندارد

معاون محترم امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

موضوع: دستورالعمل نحوه تجویز واکسن هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب

با سلام و احترام

با توجه به توزیع واکسن هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب (Hib) جهت استفاده گروه های واجد شرایط، دستورالعمل تجویز واکسن مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است دستور فرمائید مراتب جهت استحضار و اجرا به مراکز بهداشت شهرستان ها، مراکز بهداشتی درمانی، پایگاه ها، خانه های بهداشت و بخش خصوصی منطقه تحت پوشش ابلاغ گردد.

• گروه های واجد شرایط دریافت واکسن

الف: شیرخواران زیر یک سالی که با تشخیص پزشک، ممنوعیت دریافت واکسن سیاه سرفه داشته و باید واکسن توام خردسال + هپاتیت ب + واکسن هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب (Hib) را دریافت نمایند. در این گروه برای کاهش تعداد دفعات مراجعین توصیه میشود همزمان با واکسن توام خردسالان و واکسن هپاتیت ب، واکسن هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب نیز تزریق شود. برای تفکیک موارد احتمالی عوارض موضعی واکسیناسیون، واکسن هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب Hib در اندام مقابل واکسن توام خردسال تزریق شود.

در شیرخوارانی که قبلاً واکسن توام خردسالان و واکسن هپاتیت ب را دریافت کرده و در حال حاضر فقط نیاز به تزریق واکسن هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب دارند، برای دستیابی سریع تر به ایمنی مطلوب، می توان فواصل تزریق واکسن مذکور را به یک ماه کاهش داد.

ب: گروه های پرخطر واجد شرایط دریافت واکسن که شامل نقایص آناتومیک و عملکردی طحال، بیماران طحال برداری شده یا کاندیدای طحال برداری، کم خونی داسی شکل، بیماران دریافت کننده پیوند مغز

شماره: ۳۰۴/۷۷۰۰

تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۲۹

پیوست: ندارد

استخوان و اعضای توپر (solid organ)، بیماران مبتلا به HIV/AIDS، نقایص مادرزادی سیستم ایمنی و بیماران تحت شیمی درمانی و دریافت کنندگان داروهای مهار کننده سیستم ایمنی می باشد.

• نکات مورد توجه در تزریق واکسن هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب

- واکسن هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب، تک دزی می باشد.
- واکسن به صورت پودر و حلال بوده و قبل از تزریق باید بازسازی شود. پس از بازسازی باید به خوبی تکان داده شده و از حل شدن کامل آن اطمینان حاصل گردد.
- واکسن باید در تمام طول زنجیره سرما در ۸-۲ درجه سانتی گراد نگهداری شده و از یخ زدن آن اکیداً اجتناب شود.
- تزریق واکسن مذکور به میزان ۰/۵ سی سی عمیق عضلانی می باشد. تزریق وریدی واکسن اکیداً ممنوع است.
- محل تزریق تا ۲۴ ماهگی در ناحیه قدامی خارجی ران (محل تلاقی ثلث فوقانی و میانی ران) و در کودکان ۲۵ ماهه و بزرگتر، ناحیه دلتوئید می باشد.
- تا سن ۱۲ ماهگی سه دز واکسن هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب تجویز می شود. در گروه های پرخطر در سن بالاتر از ۱۲ ماه (۱۳ ماهگی به بعد) تزریق یک دز از واکسن مذکور کفایت میکند.
- واکسن هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب همزمان و یا با هر فاصله زمانی با تمام واکسن های زنده و غیر فعال قابل تزریق است. حداقل فاصله زمانی بین نوبت های واکسن هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب، یک ماه است.
- در صورت تزریق همزمان با سایر واکسن ها توصیه می شود در دو اندام مقابل و یا در یک اندام با حداقل فاصله ۲/۵ سانتی متر تزریق شود.
- از مخلوط کردن این واکسن با سایر واکسن ها اکیداً باید اجتناب شود.

شماره: ۳۰۴/۷۷۰۰

تاریخ: ۱۳۹۴/۵/۲۹

پیوست: ندارد

- در صورت واکنش حساسیتی شدید (مانند آنافیلاکسی) به دز قبلی واکسن، تزریق دزهای بعدی ممنوع است.
- در موارد بیماری های متوسط یا شدید (با یا بدون تب) و بیماری های حاد تب دار، تزریق واکسن باید تا زمان بهبودی به تعویق افتد.
- آمار تزریق واکسن هموفیلوس آنفلوانزای تیپ ب باید در قسمت پایین فرم آماری ۱۰۵ به صورت دستی و به تفکیک گروه های سنی درج گردد.
- از آنجا که مصرف این واکسن بسیار محدود است لذا از توزیع روتین به همه مراکز بهداشتی درمانی خودداری شود و بر حسب نیاز واحدهای تحت پوشش با هماهنگی قبلی، مرکز بهداشت شهرستان واکسن ذخیره شده را به سطوح عملیاتی موردنظر توزیع خواهد نمود. /

دکتر محمد مهدی گویا

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر